

ผักเสี้ยว



ชื่อสามัญ Orchid Tree , Purple Bauhinia

ชื่อท้องถิ่น ชงโค(กลาง) เลี้ยวดอกแดง(เหนือ)ผักเลี้ยว

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Bauhinia purpurea* L.

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น: ไม้สูงถึง 10 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับรูปมนเกือบกลม แยกเป็น 2 พู ปลายมนกว้าง 8 - 16 เซนติเมตร ยาว 10 - 14 เซนติเมตร - ขอบใบเรียบ ดอกช่อดอกออกข้างๆ หรือปลายกิ่ง 6-14 ดอก กลีบดอก 5 กลีบสีชมพูถึงม่วงเข้มรูปรีกว้างตรงส่วนกลางเมื่อบานวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรตัวผู้ 3 อันรังไข่มีขนยาวผลฝักยาว 20 - 25 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดเมล็ดกลมมี 10 เมล็ดในหนึ่งผล

ประโยชน์


ใบ ต้มกินรักษาอาการไอดอก เป็นยาระบายขับพิษไข้ ราก ต้มกินเป็นยาระบาย ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี ดอก และ แก่น มีสรรพคุณแก้โรคบิด ใบ มีสรรพคุณ ขับปัสสาวะ ใบอ่อน ของผักเสี้ยวเป็นผักที่ชาวเหนือนิยมรับประทานนำไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือนำไปแกง เช่นแกงกับปลา แกงกับเนื้อนิยมแกงกับผักเชียงดา ผักชะอม มีรส อร่อย





แหล่งอ้างอิง

http://thaiherb-tip108.blogspot.com/2011/02/blog-post_7492.html



จัดทำโดย

ด.ช.วชิรพงศ์ ดาวันดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

